

Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України №1266 від 16 грудня 2020 року

ДК 021:2015: 24960000-6 Хімічна продукція різна
Ендонуклеаза рестрикції; агароза для генетичної діагностики; буфер; набір для ПЛР
двократний

На виконання постанови Кабінету Міністрів України №1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів», Національний університет охорони здоров'я України ім.П.Л.Шупика (код ЄДРПОУ 01896702; адреса: вул.Дорогожицька,9, м.Київ, 04112) надає інформацію про процедури відкритих торгів (з особливостями).

Предмет закупівлі: **ДК 021:2015: 24960000-1 Хімічна продукція різна - Ендонуклеаза рестрикції; агароза для генетичної діагностики; буфер; набір для ПЛР двократний**

Номер закупівлі в електронній системі: UA-2025-04-24-012679-a

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено відповідно до службової записки №3/626 від 26.03.2025р.

Орієнтовна вартість закупівлі: 260 000,00 грн.

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації відповідно до предмету закупівлі: ДК 021:2015: 24960000-1 Хімічна продукція різна - Ендонуклеаза рестрикції; агароза для генетичної діагностики; буфер; набір для ПЛР двократний.

№	Найменування предмету закупівлі	Склад та параметри	Од. виміру	Кількість
1	Ендонуклеаза рестрикції NhaI	2000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання GCG↓C. Постачається з 10xTango буфером. Оптимальна температура реакції 37°C. Не чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
2	Ендонуклеаза рестрикції TaqI	3000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання T [^] CGA. Постачається з 10xTaqI буфером. Оптимальна температура реакції 65°C. Не чутлива до теплової інактивації.	Шт	1
3	Ендонуклеаза рестрикції NaeIII (BsuRI)	3000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання GG↓CC. Постачається з	Шт.	1

		10xBuffer R. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.		
4	Ендонуклеаза рестрикції Eco130I (StyI)	2500 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання C [^] CWWGG. Постачається з 10xBuffer O. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
5	Ендонуклеаза рестрикції AраI	3000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання GGGCC↓C Постачається з 10xBuffer B. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
6	Ендонуклеаза рестрикції BsmI (Mva1269I)	1000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання GAATGC(1/-1) [^] Постачається з 10xBuffer R. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
7	Ендонуклеаза рестрикції HinfI	2000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання G [^] ANTC. Постачається з 10xBuffer R. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
8	Агароза для генетичної діагностики	Агароза яка забезпечує оптимальну концентрацію від 0,4 до 5% у всіх буферних системах з сертифікатом якості, щодо використання для генетичної діагностики, яка забезпечує, що нуклеїнові кислоти, виділені з препаративних гелів, можна використовувати для подальших застосувань (ферментативні реакції тощо) • Низьке зв'язування ДНК/РНК • Чудова прозорість гелю. Не містить ДНКази та РНКази. Підходить для аналізу РНК • Температура плавлення 88 °C Фасування не менше 500 г.	Шт.	1

9	Буфер TBE Buffer (Tris-borate-EDTA) (10X)	Буфер TBE десятикратний, який використовується як робочий буфер для приготування агарозного гелю, при проведенні електрофорезу фрагментів ДНК розміром менше 1500 пар нуклеотидів Об'єм: 1 л	Шт.	1
10	Набір для ПЛР двократний	Набір для ПЛР двократний на 1000 реакцій, готовий до використання, що містить ДНК полімерази, двократний буфер, трифосфати, 4 мМ MgCl ₂ , воду без нуклеаз, для ампліфікації довгих мішеней розміром до 6 kb з геномної ДНК. Умови зберігання при – 20°C	Шт.	1
11	Ендонуклеаза рестрикції SspI	2500 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання AAT [^] ATT. Постачається з 10xBuffer G. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
12	Ендонуклеаза рестрикції MboI	1500 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання [^] GATC. Постачається з 10xBuffer R. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
13	Ендонуклеаза рестрикції MspI (HpaII)	5*3000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання C [^] CGG. Постачається з 10xBuffer Tango. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
14	Ендонуклеаза рестрикції Hin1III (NlaIII)	300 одиниць. Концентрація 5 од/мкл. Сайт розпізнавання CATG [^] . Постачається з 10xBuffer G. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
15	Ендонуклеаза рестрикції NcoI	1000 одиниць.	Шт.	1

		Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання C [^] CATGG. Постачається з 10xBuffer Tango . Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.		
16	Ендонуклеаза рестрикції BclI	3000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання T [^] GATCA . Постачається з 10X Buffer G . Оптимальна температура реакції 55°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
17	Ендонуклеаза рестрикції RsaI	5000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання GT [^] AC . Постачається з 10X Buffer Tango . Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
18	Ендонуклеаза рестрикції Eco47I (AvaII)	800 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання G [^] GWCC. Постачається з 10X Buffer R . Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
19	Ендонуклеаза рестрикції XbaI	3000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання T [^] CTAGA. Постачається з 10X Buffer Tango . Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
20	Ендонуклеаза рестрикції PvuII	2500 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання CAG [^] CTG . Постачається з 10X Buffer G . Оптимальна температура реакції 37°C. Не чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
21	Ендонуклеаза рестрикції Eam1105I (AhdI)	1000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання GACNNN [^] NNGTC . Постачається з 10X Buffer Eam1105I (AhdI)). Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1

22	Ендонуклеаза рестрикції BseNI (BsrI)	1000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання ACTGG(1/-1)^. Постачається з 10X Buffer B . Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
23	Ендонуклеаза рестрикції MbiI (BsrBI)	1000 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання CCGCTC(-3/-3)^. Постачається з 10X Buffer Tango. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
24	Ендонуклеаза рестрикції Bsh1236I (BstUI)	2500 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання CG^CG. Постачається з 10X Buffer R. Оптимальна температура реакції 37°C. Чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1
25	Ендонуклеаза рестрикції BseLI (BslI)	500 одиниць. Концентрація 10 од/мкл. Сайт розпізнавання CCNNNNN^NNGG . Постачається з 10X Buffer R. Оптимальна температура реакції 55°C. Не чутлива до теплової інактивації.	Шт.	1

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам встановленими Тендерною документацією (опис предмета закупівлі), викладений у цьому додатку до Тендерної документації та чинному законодавству щодо показників якості такого виду товару.

Упаковка Товарів: всі товари будуть поставлятись виключно в упаковці Виробника. Пакування та маркування товарів має відповідати характеру товарів.

Поставка товару проводиться частинами, за потребою Замовника, яка підтверджується відповідної заявкою. Строк поставки: до 25.12.2025 року.

Уповноважена особа

Ліліана Царенко