

ВІДГУК
офіційного опонента доктора медичних наук, професора
Смоланки Івана Івановича
на дисертацію Костенко Альони Андріївни на тему
«Клініко-морфологічне обґрунтування хіургічного лікування
тубулярних грудей II типу»,
представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 26.613.172 при
Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
в галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина»
(спеціалізація 14.01.03 «Хіургія»)

Актуальність теми дисертації.

Тубулярні груди відносяться до мальформацій сполучної тканини, що проявляються в пубертатному періоді (Klinger та співавт., 2011; Muti, 1996 р.). Патологія зустрічається з високою частотою асиметрії, одно-або двосторонньою та спостерігається передусім у молодих жінок (Grolleau та співавт., 1999 р.). Також може виникати в чоловіків, що мають гінекомастію (Klinger та співавт., 2011, Gorvetsian та співавт., 2019).

За даними авторів, 2% пацієнток, які звертаються до хіуррга за первинним ендопротезуванням, мають тубулярні груди (Somogyi та співавт., 2015). У спостереженнях (2006 р.) зазначається, що 3% від загальної кількості становлять операції на молочних залозах у пацієнток, які мають тубулярні груди. Ступінь вираженості тубулярності варіює від ледь помітної до значної, що потребує маскування. Тож патологія викликає психоемоційні розлади та знижує соціальну адаптацію пацієнток. Лікування тубулярних грудей є складним хіургічним завданням і реконструктивною операцією.

Універсального способу хіургічної корекції тубулярних грудей II типу не існує, а більшість операцій супроводжуються певними ускладненнями. Тож для корекції тубулярних грудей потрібен унікальний хіургічний підхід в кожному конкретному випадку. Це спонукало дисерантку до поглибленаого вивчення морфологічних особливостей тканин тубулярної груді та особливостей кровопостачання залозистої тканини тубулярної груді на макро- і мікроскопічному рівні. Вирішення цих питань і лягли в основу дисертаційної роботи.

Отже, покращення результатів хіургічної корекції тубулярної груді II типу шляхом розробки нової методики операції, на основі вивчення морфології та особливостей кровопостачання залозистої тканини є актуальним та таким, що направлене на вирішення завдань, як теоретичної медицини так і практичної охорони здоров'я.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до плану наукових досліджень Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика (термін виконання 2019-2023 рр., № державної реєстрації 0119U101148) та є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри комбустіології та пластичної хіургії.

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів.

При проведенні морфологічних досліджень тубулярної груді II типу дисеранткою вперше описано фіброз від дерми і до глибокої фасції (53% випадків), гіаліноз (53%) та ангіодиспластичні утворення (73%). Виявлені ознаки, які підтверджують вроджений характер патології і наявність проліферативного потенціалу залозистої тканини тубулярної груді.

Авторкою вперше досліджені особливості ангіоархітектоніки молочної залози пацієнток з тубулярною груддю II типу за допомогою МРТ та УЗД. У

80% пацієнток виявлено недорозвинення основних джерел артеріального кровопостачання молочної залози.

Вперше розроблено хірургічну методику корекції тубулярних грудей II типу, що включає широку мобілізацію центральної частини молочної залози, за допомогою ряду насічок у вигляді «шахової дошки» по її задній поверхні. Таким чином залозиста тканина повністю покриває нижній полюс імпланта і створює рівний контур нижнього полюса груді.

На основі отриманих результатів вперше запропоновано комплекс методик для ефективного лікування та запобігання післяопераційних ускладнень після корекції тубулярних грудей II типу, що дало можливість знизити рівень повторних операцій у 2,1 рази.

Ефективність нової методики хірургічного лікування пацієнток з тубулярною груддю II типу вперше обґрунтована шляхом проведення анкетування за шкалою Breast-Q. Застосування нової методики корекції тубулярних грудей II-го типу дозволило підвищити якість життя та покращити психосоціальну адаптацію у всіх пацієнток основної групи.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що розроблений новий хірургічний метод корекції тубулярної груді II типу впроваджений в клінічну практику в відділенні мікросудинної та пластичної хірургії ДУ «ННЦХТ ім. О.О.Шалімова». Розроблена методика корекції тубулярної груді II типу зменшує загальний рівень післяопераційних ускладнень, що знижують кількість повторних операцій. Розроблені рекомендації для запобігання ранніх післяопераційних ускладнень після хірургічної корекції тубулярної груді II типу, що скорочує термін перебування пацієнток в стаціонарі. Для оцінки якості життя пацієнток після хірургічної корекції тубулярної груді II типу запропонована шкала Breast -Q.

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в практичну діяльність закладів охорони здоров'я.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків та рекомендацій, що сформульовані в дисертації базується на достатній кількості спостережень, використаних сучасних методах дослідження та статистичному аналізі отриманих результатів.

Дослідження включало результати обстежень 54 пацієнток з тубулярними грудьми II типу, віком від 18 до 54 років, що знаходились на лікуванні в ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова» НАМН України протягом 2007-2020 рр. У морфологічну частину дослідження увійшли також 15 пацієнток з гіпоплазією груді та 8 пацієнток з нормальнюю структурою залози. Разом 77 пацієнток. Пацієнти всіх досліджуваних груп були репрезентативні за віком, індексом маси тіла, Nortwood індексом. Дослідження правильно побудовано, методичні підходи сучасні та адекватні щодо поставлених задач. При проведенні дослідження застосовувались такі методи: загальноклінічні, патогістологічні, інструментальні, статистичні. Для проведення дослідження дані були зібрані та збережені в електронних таблицях Microsoft Excel 2019. Статистична обробка даних, отриманих під час досліджень, проводилася із застосуванням програмного пакету для статистичного аналізу «STATISTICA 12 for Windows» (StatSoft Inc., США). За допомогою критерію Шапіро-Уїлка, непараметричного U-критерій Манна-Уїтні було перевірено нормальність закону розподілу досліджуваних показників та проведено порівняння незалежних сукупностей, представлених у кількісному вигляді, бо кількість пацієнтів у групах становила менше ніж 50. Також застосовувався метод варіаційної статистики за критерієм t Стьюдента для вибірок з нормальним розподілом з обчисленням показника довірчої ймовірності Р. Для оцінки взаємозв'язку між досліджуваними показниками використовувався метод

лінійної кореляції з використанням коефіцієнта кореляції Пірсона. Цифрові були достатньо проаналізовані. Для обговорення та інтерпретації результатів дослідження використано достатню кількість сучасних літературних джерел. Отже, з методичної точки зору, дисертація виконана правильно, а сформульовані авторкою основні положення та висновки є логічним наслідком результатів власних досліджень.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.

Основний зміст дисертаційної роботи викладений у 9 наукових працях. Одна стаття у науковому фаховому зарубіжному виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази Scopus, 3 статті у наукових фахових виданнях України (в т.ч. 1 у виданні включенному до міжнародної наукометричної бази Web of Science), 3 тез міжнародних науково-практичних конференцій та конгресів, 2 патенти України на корисну модель. Опубліковані наукові праці в повному обсязі відображають зміст дисертаційної роботи.

Оцінка змісту, оформлення та обсягу дисертації.

Дисертація викладена українською мовою і складається з анотації, переліку умовних скорочень, вступу, 6 розділів, у тому числі огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Дисертація викладена на 150 сторінках, з яких 133 - обсяг основного тексту. Робота включає 10 таблиць та 43 рисунка, список використаних джерел містить 132 найменувань. Усі розділи написані грамотно, практично без стилістичних і редакційних помилок.

Вступ повноцінний і має всі складові, що передбачені вимогами до дисертаційної роботи. У вступі добре аргументовано актуальність

досліджуваної проблеми. Мета чітко сформульована, завдання відповідають поставленій меті.

Розділ 1, де дисертантка аналізує сучасні погляди на проблему хірургічного лікування тубулярної груді II типу, теорії виникнення та способи хірургічного лікування даної патології, містить посилання на велику кількість сучасних літературних джерел. Розділ читається легко, свідчить про компетентність дисертантки в знаннях про проблему тубулярної груді II типу.

Розділ 2 надає достатню інформацію про матеріали та методи дослідження, детальну характеристику пацієнтів та принципи їх розподілу на групи. В основу роботи покладені результати обстежень 54-х пацієントок з тубулярними грудьми II типу. Всі пацієнти були розподілені на дві групи – основну та групу порівняння. Основна група складала 28 пацієントок прооперованих за розробленою методикою. Група порівняння становила 26 пацієントок прооперованих за стандартною методикою(A.Mandrakas). Для виконання морфологічного дослідження пацієントок було розподілено на три групи (15 пацієントок з тубулярною груддю, 15 - з гіпоплазією молочних залоз та 8 пацієントок з нормальнюю структурою молочних залоз). При проведенні дослідження застосовані загальноклінічні, інструментальні, морфологічні, статистичні методи, що є сучасними, та їх оцінка дозволяє зробити обґрунтовані висновки.

Розділ 3 відображає ретельне вивчення ангіоархітектоніки та особливостей структури тубулярної груді на макро- і мікроскопічному рівнях. У викладеному матеріалі проведених досліджень вперше було виявлено ангіодиспластичні утворення (73% випадків), фіброз від дерми й до глибокої фасції (53%) та гіаліноз (53%). Встановлено, що наявність осередків вираженого мікроангіоматозу свідчить про високий проліферативний потенціал щодо можливостей відновлення й посилення кровопостачання в зонах ішемії, гіпоксії та в зонах травматизації залозистої тканини. Судинне русло МЗ пацієントок із тубулярними грудьми II типу також було досліджено за

допомогою МРТ з контрастуванням та УЗД. Виявлено особливості ангіоархітектоніки тубулярної МЗ: у 80% пацієнток спостерігалося недорозвинення основних джерел кровопостачання молочної залози.

Розділ 4 містить інформацію про результати клінічного дослідження. Достатньо обґрунтовано і описано нову хірургічну методику корекції тубулярних грудей II-го типу. Запропонована методика має низку переваг, оскільки дає змогу ширше мобілізувати та розсікати клапоть із центральної частини залози за допомогою надсічок у вигляді шахової дошки. При цьому інтактним залишається верхній медіальний квадрант залози, що включає основні джерела кровопостачання. З іншого боку, методика дає змогу повністю вкрити імплантат залозистим клаптем і без натягу фіксувати його до субмамарної складки двома прошивками. Це запобігає його скороченню, створює надійний широкий чохол для імплантата й запобігає зміщенню сосково-ареолярного комплексу, що трапляється при спробі зафіксувати короткий клапоть до субмамарної складки. Завдяки прошивкам також вдається краще підкреслити нову субмамарну складку. Циркумареолярний доступ дає змогу провести достатню мобілізацію залози, а потім скоригувати мегаареолу чи асиметрію сосково-ареолярного комплексу.

В розділі добре проведено оцінку післяопераційних ускладнень. Запропоновано хірургічні методики їх корекції, що дало змогу отримати гарні стабільні віддалені післяопераційні результати.

Розділ 5 включає дані анкетування, що доводять ефективність нової методики хірургічного лікування пацієнток з тубулярними грудьми II типу. Застосування нової методики корекції тубулярних грудей II типу дозволило покращити значно покращити психосоціальну адаптацію жінок до 90,25% (за шкалою Breast-Q).

Розділ 6 представляє аналіз та узагальнення результатів власних досліджень, в якому авторка відображає результати проведеного дослідження та підкреслює власні нові результати виконаного наукового дослідження.

Висновки дисертації відповідають завданням, закономірно випливають із проведеного дослідження і показують основні результати проведеної роботи. Дослідження проведено ретельно і на високому методологічному рівні.

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності.

У дисертаційній роботі не встановлено ознак академічного plagiatu, фальсифікації чи інших порушень, що могли б поставити під сумнів самостійний характер виконання дисертанткою представленого наукового дослідження. Текст є оригінальним, всі цитати коректно позначені та вказані в списку використаних джерел.

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення.

Робота має достатньо високий науковий рівень. Проте в процесі рецензування виникли наступні зауваження:

- цифрові результати (анотація, вступ, висновки) подаються в тексті без зазначення критерію достовірності p;
- дуже змістовний розділ морфологічних досліджень, проте на мікрофотографіях не вказано стрілками зазначені в тексті структури;
- не чітко сформульовані клінічні критерії оцінки естетичного результату хірургічної корекції тубулярної груді II типу.

В роботі є незначні стилістичні та орфографічні помилки, які, проте, жодною мірою не знижують наукової цінності дослідження та суттєво не впливають на загальне позитивне враження від нього.

Разом з тим хотілося б отримати від дисертанта відповідь на декілька запитань:

1. Чим зумовлений такий розподіл на групи у морфологічній складовій дослідження?

2. Яка діагностична цінність МРТ з контрастуванням у пацієнток з тубулярними грудьми та які переваги на відміну від УЗД?
3. Чи впливала розроблена методика корекції тубулярної груді на здатність жінки годувати груддю?

Рекомендації щодо використання результатів дослідження.

Дисертаційна робота Костенко Альони Андріївни має вагоме практичне значення. Впровадження результатів виконаного дослідження дозволить покращити результати хірургічної корекції тубулярної груді II-го типу шляхом розробки нової методики операції, на основі вивчення морфології та особливостей кровопостачання залозистої тканини.

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку присудження наукових ступенів» до дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

Дисертаційна робота Костенко Альони Андріївни «Клініко-морфологічне обґрунтування хірургічного лікування тубулярних грудей II типу», яка представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 222 «Медицина», є цілісним і завершеним науковим дослідженням, що містить нові, науково обґрунтовані результати, які вирішують важливе практичне завдання покращення результатів хірургічної корекції тубулярної груді II-го типу шляхом розробки нової методики операції, на основі вивчення морфології та особливостей кровопостачання залозистої тканини.

За рівнем досліджень, актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною цінністю отриманих даних, сформованих обґрунтованих висновків, що відповідають поставленій меті і завданням, дисертаційна робота повністю відповідає вимогам до оформлення дисертації, затверджених наказом МОН України від 12.01.2017 р. № 40, які пред'являються до наукового

ступеня доктора філософії та «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», а її автор повністю заслуговує присудження ступеня доктора філософії.

Офіційний опонент -
завідувач науково-клінічного відділу
пухлин грудної залози та її реконструктивної
хірургії ДНП «Національний інститут раку»,
доктор медичних наук, професор



Смоланка І.І.



Смоланка
10